АКТИВ ФЛОРА 0+ бебі+

Лист-вкладиш по застосуванню дієтичної добавки

***Lactobacillus rhamnosus* GG DSM33156 (Probio-Tec® LGG®, Chr. Hansen)**

Біологічно активна добавка призначена для новонароджених, немовлят, дітей та дорослих.
Може також застосовуватись у недоношених дітей.
Використовується для збільшення кількості корисних бактерій у шлунково-кишковому тракті.

АКТИВ ФЛОРА бебі+ містить живу культуру бактерій *Lactobacillus rhamnosus* GG DSM33156, яку виробляє один із лідерів виробництва лактобактерій у світі – компанія Кр. Хансен. Штам, депонований як DSM33156, на 100% ідентичний штаму вперше виділеному та охарактеризованому вченими, які передали його у 1987 р. компанії Valio та правонаступнику - компанії Chr. Hansen. Використання цього штаму ретельно вивчено у новонароджених та недоношених, дітей, вагітних жінок, дорослих та людей похилого віку. Безпека та пробіотичні властивості *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG®**) підтверджені численними науковими дослідженнями[1,2,3,4,5,6,7,8.] Штам має високу стійкість до жовчі та кислот, що важливо для виживання бактерій при проходженні через шлунково-кишковий тракт та реалізації їх корисного потенціалу.
До складу продукту входять тригліцериди середнього ланцюга, виділені з кокосової олії, які присутні у складі грудного молока і вже кілька десятиліть використовуються в складі сумішей для дитячого харчування, а також застосовуються для поліпшення харчування дітей з низькою масою тіла. Цей компонент не тільки безпечний для застосування, але й пригнічує колонізацію грибів роду *Candida* в шлунково-кишковому тракті, які є причиною виникнення інфекцій у немовлят[9].

Склад: тригліцериди середнього ланцюга (з кокосової олії), культура живих ліофілізованих мікроорганізмів *Lactobacillus rhamnosus* GG DSM33156 (Probio-Tec® LGG®, Chr. Hansen) – 1x10^{9} КУО* в 1 краплі.

БЕЗ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ | БЕЗ ЛАКТОЗИ | БЕЗ ЦУКРУ | БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ | БЕЗ ГМО

Харчова та енергетична цінність		
Показник	**Вміст у 6 краплях**	**Вміст у 12 краплях**
Енергетична цінність	1.95 ккал (kcal) 8.00 кДж (kJ)	3.89 ккал (kcal) 16.00 кДж (kJ)
Білки	0,01 г (g)	0,02 г (g)
Жири	0,22 г (g)	0,44 г (g)
У тому числі насичених жирних кислот	0,21 г (g)	0,42 г (g)
Вуглеводи	0,01 г (g)	0,02 г (g)
У тому числі цукру	0,00 г (g)	0,01 г (g)
Клітковина	0,00 г (g)	0,00 г (g)
Солі	0,00 г (g)	0,01 г (g)
Lactobacillus rhamnosus GG DSM33156	6 x 10^{9} КУО*	12 x 10^{9} КУО*

*КУО - колонієутворюючі одиниці.

Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована лікарем до раціону харчування з метою підтримки та відновлення нормального балансу кишкової мікрофлори та нормальної роботи кишечника внаслідок прийому антибіотиків, зміні характеру харчування та ін., при станах організму, які опосередковано пов'язані з дисбалансом кишкової мікрофлори. Нормальний баланс кишкової мікрофлори сприяє підтримці процесів травлення та імунітету.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість[10]: під час прийому їжі: для дітей грудного та раннього віку – 1-6 крапель на добу, дітям віком від 3 до 12 років - 6 крапель на добу , дітям віком від 12 років та дорослим – 12 крапель на добу. Додавати краплі можна до їжі або безпосередньо в рот. Не змішувати краплі із занадто холодною або гарячою їжею. **Перед кожним використанням збовтати вміст флакону до отримання однорідної суспензії.** Не змінює смак напоїв та їжі.

У разі антибактеріальної терапії **АКТИВ ФЛОРА бебі+** можна приймати разом з антибіотиками. Для максимальної ефективності інтервал між прийомом крапель **АКТИВ ФЛОРА бебі+** та антибіотиком має складати 2 години.

Застереження щодо споживання: не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів. Не застосовувати недоношеним дітям з масою тіла менше 1000 г[11]. Особам із значно зниженим імунітетом та недоношеним дітям застосовувати тільки за рекомендацією лікаря. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Не є лікарським засобом
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря

Термін придатності: 2 роки.

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°C в закритій упаковці в недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Зберігати в оригінальній упаковці. Після першого відкриття продукт слід використати протягом 30 днів. На дні флакону може з'явитися осад, який не впливає на безпеку та якість продукту.

Форма випуску: краплі оральні у флаконі по 5 мл (ml) або по 10 мл (ml).

Країна виробництва: Польща.

Alpen Pharma

Вироблено для:
Альпен Фарма АГ,
Берн, Швейцария.

Імпортер: ПрАТ «НАТУРФАРМ», Україна, 04075 м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, буд. 30-А.

[1]Arvola T, et al. Prophylactic Lactobacillus GG reduces antibiotic-associated diarrhea in children with respiratory infections: a randomized study // Pediatrics, 1999; 104(5): e64.
[2]Underwood MA, et al. A randomized placebo-controlled comparison of 2 prebiotic/probiotic combinations in preterm infants: impact on weight gain, intestinal microbiota, and fecal short-chain fatty acids // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2009; 48(2): 216-25.
[3]Vanderhoof JA, et al. Lactobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children // The Journal of Pediatrics, 1999; 135(5): 564-8.
[4]Hojsak I, et al. Lactobacillus GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections // Pediatrics, 2010; 125(5): e1171-7.
[5]Isolauri E, et al. A human Lactobacillus strain (Lactobacillus casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children // Pediatrics, 1991; 88(1): 90-7.
[6]Gueimonde M, et al. Effect of maternal consumption of lactobacillus GG on transfer and establishment of fecal bifidobacterial microbiota in neonates // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2006; 42(2): 166-70.
[7]Lahtinen SJ, et al. Lahtinen SJ, et al. J. Allergy Clin. Immunol., 2009; 123(2): 499-501
[8]Hatakka K, et al. Probiotics reduce the prevalence of oral candida in the elderly - a randomized controlled trial // J. Dent. Res., 2007; 86(2): 125-30.
[9]Amanda B Arsenault et al. Dietary Supplementation With Medium-Chain Triglycerides Reduces Candida Gastrointestinal Colonization in Preterm Infants // Pediatr. Infect. Dis. J., 2019; 38(2): 164-168.
[10]Probiotics and prebiotics / World Gastroenterology Organisation Global Guideline, 2023.
[11]Poindexter B. et al. Use of Probiotics in Preterm Infants // Pediatrics (2021) 147 (6): e2021051485.

**LGG® є торговою маркою компанії Chr. Hansen (Данія).